



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



ପତ୍ର ସଂ-୨୯/୨୦୨୨ ସପ୍ତାହ-୪୦ ଗୁରୁବାର, ତାରିଖ-୦୧.୧୦.୨୦୨୨

ଭବାନୀପାଟଣା କୃଷିପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ର ମୁନିଟ୍ ରେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା :

ସର୍ବମୋଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ (୦୧-୦୧-୨୦୨୨ ଠାରୁ)	୧୩୦୯.୨/୨୩
ସାପ୍ତାହିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ(ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ	୮୫.୮୦/୦୨
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୩୦.୫
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୨୨.୭

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ :

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷାର ପରିମାଣ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ଆକାଶରେ ମେଘର ପରିମାଣ (ଅକଟା)	ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କଳାହାଣ୍ଡି	୦୨-୧୦-୨୦୨୨	୦	୩୪	୨୨	୧	୯୩	୪୩	୧	୨୧୪
	୦୩-୧୦-୨୦୨୨	୦	୩୫	୨୨	୨	୯୦	୩୮	୨	୨୩୩
	୦୪-୧୦-୨୦୨୨	୦	୩୫	୨୩	୧	୮୮	୩୪	୩	୧୯୪
	୦୫-୧୦-୨୦୨୨	୦	୩୫	୨୩	୦	୮୭	୨୭	୪	୧୮୯
	୦୬-୧୦-୨୦୨୨	୦	୩୪	୨୩	୦	୮୯	୨୫	୪	୨୦୨

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍.#୦୬୭୪ - ୨୫୯୨୧୧୭

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର/ସତର୍କ ସୂଚନା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଉପରୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩ ରୁ ୦୪ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୪ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୪ ରୁ ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୨ ରୁ ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୭ ରୁ ୯୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୨୫ ରୁ ୪୩ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ।

ଟେଡାବନୀ : ନାହିଁ

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପରାମର୍ଶ

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

- ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ, କ୍ଷେତରେ ଘାସ ବାଛିବା, ଅନ୍ଧ-ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ ।
- ସକାଳ ସମୟରେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେତୁ ରୋଗପୋକ, ବିଶେଷ କରି କବକଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଶୋଷକ ପୋକର ପ୍ରାବୃତ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଫସଲକୁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଫସଲ ର ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ପ୍ରତିଷେଧକ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ସମୟରେ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ମାତ୍ରାଧିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କୀଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ । ତେଣୁ କୀଟନାଶକ କୁ ସବୁବେଳେ ଅବଳ ବଦଳ କରି ତଥା ମିଶ୍ରିତ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ଦିନବେଳା ଗରମ/ଉତ୍ତାପ ଅଧିକ ଥିବା ସମୟରେ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଛାଇ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତା		ଧାନ ଚାଷରେ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କପର୍ ଓକ୍ସିକ୍ଲୋକ୍ସାଲଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଫସଲ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ		
ଫସଲ ର ନାମ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	ପରାମର୍ଶ
କ୍ଷେତ୍ର ଫସଲ		
ଖରିଫ ଧାନ	ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା ରୁ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା : ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ସମୟରେ ଡିପ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୬ କି.ଗ୍ରା. ମୁରିଆ + ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଓ ଖାଲୁଆ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ମୁରିଆ + ୧୩ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି ଦିତୀୟ ଦଫା ସାର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମହିଷା ରୋଗ : ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ଛିଟି ଧାନରେ ମହିଷା/କ୍ଲଷ୍ଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ଗ୍ରାମ୍ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୫୦% + ଟ୍ରାଇକୋକ୍ସିକ୍ସୋବିନ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି. (Tebuconazole 50% +



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଣ୍ଡିତ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



		Trifloxystrobin 25% WG) କିମ୍ବା ୩୦୦ ମିଲିଲିଟର ଆଇସୋପ୍ରୋଥାଲେନ୍ ୪୦% ଇ.ସି. (Isoprothiolane 40% EC) କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ▪ ପତ୍ରାଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ : ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଏହି ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୫୦ % + ଗ୍ରାଭାକ୍ସିଫ୍ଲୋପିଡ୍ ୨୫ % ଡବ୍ଲୁ.ଜି. ୮୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫ % ଇ.ସି କୁ ୨୦୦ ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ▪ ବାଜାଣ୍ଡ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା: ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ବାଜାଣ୍ଡ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା / ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଲିଫ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ରୋଗର ପ୍ରାବୃତ୍ତାବ ବେଶାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କପର୍ ଓକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ▪ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି / ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ: ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ / ବି.ପି.ଏଚ୍ (BPH) ଏବଂ ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ / ଡବ୍ଲୁ.ବି.ପି.ଏଚ୍ (WBPH) ର ପ୍ରାବୃତ୍ତାବ ବେଶାଯାଇପାରେ । ଯଦି ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିସୀମା / ଇ.ଟି.ଏଲ୍ (ଗୋଛି ପ୍ରତି ୫-୧୦ ଟି ପୋକ) ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଜମାଇ ନରଖି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜମି ଓବା ଓ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହେ, ତେବେ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ: 1. ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି (Pymetrozine 50% WG) @ ୧୨୦ ଗ୍ରାମ୍, କିମ୍ବା 2. ଡିନୋଟେଫୁରାନ୍ ୨୦% ଏସ୍.ଜି (Dinotefuran 20% SG) @ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍, କିମ୍ବା 3. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍ (Imidacloprid 17.8% SL) @ ୫୦ ମିଲି, କିମ୍ବା 4. ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ୍ ୨୦% + ଏସିଫେଟ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି (Buprofezin 20% + Acephate 50% WP) @ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍, କିମ୍ବା 5. ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି (Fonicamid 50% WG) @ ୬୦ ଗ୍ରାମ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ▪ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି / ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
କପା	ଫୁଲ ରୁ ବକରା ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା	▪ କପା ଫସଲ ୯୦ ଦିନର ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ୧୦୦ ସେ.ମି. ହୋଇଗଲେ ଟୋପିଙ୍ଗ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । (ମୁଖ୍ୟ କାଣ୍ଡର ଅଗ୍ର ଭାଗକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ) । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛର ଉପର ମୁହାଁ ଅବିବୃଦ୍ଧି ରଖି ହେବା ସହ ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ▪ ଶୋଷକ କୀଟ (ଜଉ, ଉକୁଶିଆ, ପତ୍ରଡିଆଁ, ଦହିଆ ଓ ଧଳାମାଛି): ବର୍ତ୍ତମାନ ର ପାଗ ଶୋଷକ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୮୦ ଗ୍ରା. ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି କିମ୍ବା ୮୦ ଗ୍ରା. ଥିଓମେଥୋକ୍ସମ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି ନଚେତ ୪୦୦ ମି.ଲି. ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ୍ ୨୫% ଏସ୍.ସି କିମ୍ବା ୨୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ଡାଇଫେନଥୁରିଅନ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ▪ ଡମାଣ୍ଡ ପତ୍ରକଟା ପୋକ: ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ଡମାଣ୍ଡ ପତ୍ରକଟା ପୋକ / ଟୋବାକୋ କାଟିପିଲାର୍ (Tobacco caterpillar) ର ପ୍ରାବୃତ୍ତାବ ବେଶାଦେଇଛି । ଏହି ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ଟୋବାକୋ ଲୁଅର୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫେରୋମୋନ୍ ଗ୍ରାପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଲୁଅର୍ କୁ ବଦଳାନ୍ତୁ । ଯଦି ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା / ଇ.ଟି.ଏଲ୍ ରୁ ଅଧିକ ରହେ, ତେବେ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ସମୟରେ ନୋଭାଲୁରନ୍ ୮.୮% ଏସ.ସି. @ ୨ ମିଲି/ଲିଟର ପାଣି କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାଣ୍ଡାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୧୮.୫% ଏସ.ସି. @ ୩ ମିଲି/୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ହରିଡ଼	ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	▪ ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ସଂକ୍ରମଣ କୁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଫସଲରେ ଶୋଷକ କୀଟ ଯଥା ଜଉ, ପତ୍ର ଡିଆଁ ଓ ଉକୁଶିଆ ପୋକର ଉପସ୍ଥିତି ବେଶା ଦେଇପାରେ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ଥିଓମେଥୋକ୍ସମ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି କିମ୍ବା ୬୦ ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ.ଏଲ୍ କୁ ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ▪ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ବେଶା ଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ବେଶାଦେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ ମେଟିରାମ୍ ୭୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି		



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଣ୍ଡିତ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



କୋବି ଜାତୀୟ ପରିପରିବା (ପୁଲକୋବି, ପତ୍ରକୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି)	ନର୍ସରୀ	ନର୍ସରୀ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୩ ମିଟର ଲମ୍ବ, ୧ ମିଟର ଓସାର ଓ ୧୫-୨୦ ସେ.ମି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପଟାଳି ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ପଟାଳି ପିଛା ୧୫ ରୁ ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସଜା ଗୋବର ଖତ ଓ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫୋସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଏକର ଜାଗା ଚାଷ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କିସମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୦ ରୁ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ସଂକର କିସମ (ହାଇବ୍ରିଡ୍) କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦୦ - ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ବରକାର ପଡ଼ିଥାଏ।
ପିଆଜ	ନର୍ସରୀ	ନର୍ସରୀ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୩ ମିଟର ଲମ୍ବ, ୧ ମିଟର ଓସାର ଓ ୧୫-୨୦ ସେ.ମି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପଟାଳି ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ପଟାଳି ପିଛା ୧୫ ରୁ ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସଜା ଗୋବର ଖତ ଓ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫୋସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଏକର ଚାଷ ପାଇଁ ୪-୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ୫୦ ବର୍ଗ ମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ନର୍ସରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଝାଉଳା ଓ ମୂଳସଜା ରୋଗର ପ୍ରତିରୋଧକ ରୂପେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ କୁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ସ୍ପ୍ରେପଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ଓ ୧୦ ଗ୍ରାମ କର୍ବେନଡାଜିମ୍ କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ନର୍ସରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଟାଳି କୁ ଭିୟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ: ଏଗ୍ରୀ ଫାଉଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ରେଡ୍, ଭୀମା ସୁପର, ଭୀମା ରେଡ୍, ଭୀମା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି।
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ		
ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି		ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କୁ ଦେଖି ଆଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଗୃହାଳରେ ଉତ୍ତମ ପବନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାବାସ୍ଥା କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନାପିଆର ପରି ଘାସ କୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଚାଷ କରି ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା		ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧତା, ତାପ ତାପ ଓ ପରଜୀବି ସଂକ୍ରମଣ ର ଲକ୍ଷଣ ଜାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କୃମି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ । ଫାଟୁଆ ଓ ଛେଳି ମଡ଼କ ପରି ସାଧାରଣ ରୋଗ ବିରୋଧ ରେ ଟିକା କରଣ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କୁକୁଡ଼ା		କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ମାନେ ଡିପ ଲିଟର ପ୍ରଣାଳୀ ମାଂସ ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଥିବା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଓ ତାପମାତ୍ରା କୁ ଆୟତ ରେ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ନୋଡାଲ ଅଫିସର

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା

ବି.ବ୍ର:- ଭାନୀୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ “ମଉସମ”, ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ସୂଚନା ପାଇଁ “ମେଘସୂଚ” ଓ ବିଜୁଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ “ବାନିନୀ” ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୃଷିରେ ଅଧିକତର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ **ଓୟୁଏଟି କଲିଙ୍ଗ** ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ବିହନ, ଚାଉଳ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଟିସୁ କଲର ଚାଉଳ, ଫଳ ଓ ପରିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉପାଦ, ଅଳ୍ପକିକା ଯାଆଁଳ/ ବର୍ଷିକୀୟା ଯାଆଁଳ, କୁକୁଡ଼ା ଟିଆଁ, ପଶୁ ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜି , ଜୀବାଣୁ ସାର , ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ , ଜିଆ ଓ ଜିଆଖତ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି)।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ର ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଓ କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ସୂଚନା ଏବେ ଉତ୍ତମ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମେଘସୂଚ ଆପ ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପ ତାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।
 (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)