



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



ପତ୍ର ସଂ-୨୨/୨୦୨୨ ସପ୍ତାହ-୩୧ ମଙ୍ଗଳବାର, ତାରିଖ-୦୪.୦୮.୨୦୨୨

ଭବାନୀପାଟଣା କୃଷିପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ର ମୁନିଟ ରେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା :

ସର୍ବମୋଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ (୦୧-୦୧-୨୦୨୨ ଠାରୁ)	୨୪୪.୨/୩୩
ସାପ୍ତାହିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ(ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ	୧୧୩.୨/୦୩
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୩୧.୩
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୨୪.୮

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ :

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷାର ପରିମାଣ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ଆକାଶରେ ମେଘର ପରିମାଣ (ଅକଟା)	ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କଳାହାଣ୍ଡି	୦୫-୦୮-୨୦୨୨	୧୫	୩୩	୨୫	୬	୯୦	୬୫	୮	୨୪୫
	୦୬-୦୮-୨୦୨୨	୩୦	୩୨	୨୫	୬	୯୦	୬୭	୭	୨୪୧
	୦୭-୦୮-୨୦୨୨	୪୦	୩୨	୨୪	୬	୯୨	୭୦	୭	୨୩୬
	୦୮-୦୮-୨୦୨୨	୨୦	୩୨	୨୪	୭	୯୦	୬୩	୮	୨୪୨
	୦୯-୦୮-୨୦୨୨	୧୫	୩୨	୨୪	୫	୯୦	୬୦	୧୦	୨୪୨

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍.#୦୬୭୪ - ୨୫୯୨୧୧୨

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର/ସତର୍କ ସୂଚନା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଉପରୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସକ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା (୧୫ ରୁ ୪୦ ମିମି/ଦିନ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଶ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦୭ ରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ରୁ ୩୩° ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ରୁ ୨୫° ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୯୦ ରୁ ୯୨% ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୬୦ ରୁ ୭୦% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ।

ଟେଡାବନୀ : ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟିବା ପବନ ବହିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସକ୍ତା ୫ ଏବଂ ୬ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୨ ରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପରାମର୍ଶ

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

- ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବର୍ଷା ନିକଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଜଳବନ୍ଦୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପନିପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଚୈଳବାଜ, କପା ଏବଂ ଫଳ ବଗିଚା ସମେତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଫସଲ ଜମିରେ ଉତ୍ତମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
- ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ତେଣୁ ନିୟମିତ ଫସଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶ୍ରେୟ କରନ୍ତୁ ।
- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପନିପରିବା ନର୍ସରୀ/ଡାଲିଘରାକୁ ପଲିଥିନ୍ ଛାଉଣି କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଗୋରୁଗାଈ ଓ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖିଲା ଦାନା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତା		ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବିଜୁଳି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ, ଏଭଳି ପାଗ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୋଲା ଜମି କୁ ଯିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବାମିନୀ ଆୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜୁଳି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତୁ ।
ଫସଲ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ		
ଫସଲ ର ନାମ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	ପରାମର୍ଶ
କ୍ଷେତ୍ର ଫସଲ		
ଖରିଫ ଧାନ	ପିଲ / ତଳି/ ରୁଆ ଅବସ୍ଥା	ବୁଣା ଧାନ : ଘାସ ପରିଚାଳନା : ଗଜା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ ଧାନ ବୁଣିବା କିମ୍ବା ରୋଇବାର ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୨୦ ମି.ଲି. ବିଶ୍ୱାଜରିବାକ୍ ସୋଡିୟମ ୧୦% ଏସ.ସି. କିମ୍ବା ବୁଣିବାର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୪୦ ରୁ ୨୬୦ ମି.ଲି. ଫେନୋକ୍ସାପ୍ରୋପିଲ୍ ପି ଇଥାଇଲ୍ ୧୦% ଇ.ସି. କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



		ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟମ ଓ ଖାଲ ଜମିରେ ଯେଉଁଠି ଘାସ ମରା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନାହିଁ, ସେଠାରେ ୪ ଲକ୍ଷ ପାଣି ଜମିରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବେଉଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଖେଳୁଆ କରନ୍ତୁ । ରୁଆ ଧାର : ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା : ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କିଣ୍ଟାଲ ସଜା ଗୋବର ଖତ କୁ ମାଟିରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ଜମିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଡିପ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୭ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି + ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଓ ଖାଲୁଆ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକର ପ୍ରତି ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି + ୨୭ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମାଟିରେ ଜିଙ୍କ୍ ଏବଂ ବୋରୋନ ଅଣୁସାର ର ଅଭାବ ଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋରାକ୍ସ (୧୦.୫% ବୋରୋନ) ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନର ତଳି କୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ବୁଦା ପ୍ରତି ୨-୩ ଟି ଚାବା ଏବଂ ଗଛ ରୁ ଗଛ ଦୂରତା ୬ ଲକ୍ଷ ଓ ଧାଡ଼ି ରୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା ୮ ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ ଧାଡ଼ି ରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରନ୍ତୁ । ଘାସ ପରିଚାଳନା : ଗଜା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ବେନସଲଫୁରନ୍ ମିଥାଇଲ ୦.୨% + . ପ୍ରତିଲିଲୋର ୨% ଜି.ଆର କୁ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ରୋଇବାର ୧ ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
କପା	ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	- ଜମିରୁ ବଳକା ବର୍ଷାପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । - ଶୋଷକ ପୋକ (ଉକୁଣିଆ ପୋକ, ପତ୍ରତ୍ରାଆଁ ପୋକ ଏବଂ ଧଳାମାଛି) ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦-୮୦୦ ମି.ଲି. ନିମ୍ଫ ଡେଲ + ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସର୍ପ/ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡରକୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ) ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । - ଶୋଷକ ପୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ବମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ଲେଖାଏଁ ହଳଦିଆ ଅଠା ବୋଲା କାର୍ଡ (Yellow sticky traps) ଲଗାନ୍ତୁ । - ଫୁଲ ଓ କଢ଼ ଝଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୩.୫ ମି.ଲି. ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ ହରମୋନ୍ କୁ ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ଲଗାଇବାର ୩୦ ରୁ ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ହରଡ଼	ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	- ଜମିରୁ ବଳକା ବର୍ଷାପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । - ଫସଲରେ ପୋକର ପ୍ରାବୃତ୍ତାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ କ୍ଷେତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ଜଉପୋକ (ଆଫିଡ଼) ଏବଂ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଭଳି ଶୋଷକ ପୋକଙ୍କ ବାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (୧୫୦୦ ppm) ଲିଟର ପ୍ରତି ୩ ମି.ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଘାସ ପରିଚାଳନା : ଏକର ପ୍ରତି ୩୦୦ ମି.ଲି. ଇମାଜେଥାପିର ୧୦% ଏସ୍.ଏଲ୍ (Imazethapyr 10% SL) କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିହନ ବୁଣିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ମକା	ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	- ଜମିରୁ ବଳକା ବର୍ଷାପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । - ପୋକର ପ୍ରାବୃତ୍ତାବକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କ୍ଷେତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । - ଶୋଷକ ପୋକ (ଜଉପୋକ ଏବଂ ଉକୁଣିଆ ପୋକ) ଓ ଫଲ୍ ଆର୍ମିଡ଼ାର୍ମ ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (୧୫୦୦ ppm) ଲିଟର ପ୍ରତି ୫ ମି.ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଘାସ ପରିଚାଳନା : ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ନିର୍ମଳ ଥିବା ସମୟରେ ବିହନ ବୁଣିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୧୫ ମି.ଲି. ଟେମ୍ବୋଟ୍ରାୟନ୍ ୩୪.୪% ଏସ୍.ସି (Tembotrione 34.4% SC) କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି		
ଲଙ୍କା	ଚାବା /ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	୩୦ ରୁ ୪୫ ଦିନର ଚାବା ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରନ୍ତୁ । - ପ୍ରତିରୋପଣ କରି ସାରିଥିଲେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୁନଃ ନୂଆ ଚାବା କୁ ପ୍ରତି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ । ଉକୁଣିଆ ପୋକ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପମାତ୍ରା ଉକୁଣିଆ ପୋକ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ପ୍ରତିରୋପଣ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଚାରିପଟେ ମକା ଲଗାନ୍ତୁ । ଏକର ପିଛା ୧୨ ରୁ ୧୫ ଟି ନୀଳ ଅଠାଲିଆ



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଣ୍ଡିତ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



		କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ।
କବଳୀ	ଅଙ୍ଗୀୟ/ଫଳ ଅବସ୍ଥା	ସମ୍ପ୍ରତି ପାଗରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ କବଳୀ ଗଛରେ ସିଗାଟୋକା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ସିଗାଟୋକା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଏବଂ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପତ୍ର କୁ ଅଲଗା କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କବଳୀ ବାଡ଼ି ରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବ । ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାର୍ବେନ୍ଥାଇମ୍ ଓ ମାକୋଜେବ ର ମିଶ୍ରିତ ଫିଫ୍ଟିନାଶକ କୁ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଅଥବା ପ୍ରୋପିକୋନାୟୋଲ ୨୫% ଇସି ୧ ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିତା ୦.୫ ମିଲି ଆଡ଼କୁଭାଣ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରି ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ମାଛ ଚାଷ		ତୁନ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁନ ପୋଖରୀ ଜଳର କ୍ଷାରତ୍ୱ, ପୋଖରୀର ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ମାପକାଠି। ତୁନ ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ବିଶୋଧନ କରି ରୋଗ ଓ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଥାଏ। ତୁନ ପାଣିରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ରଦୀଭୂତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକର ପିଛା ୧୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ତୁନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ		
ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି		ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଭଲ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଥିବା ଗୃହାଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଖୁରା ରୋଗ (FMD), ସାହଣ (HS) ଏବଂ ବଜବଜିଆ (BQ) ବିରୋଧରେ ନିୟମିତ ଟିକାକରଣ କରାନ୍ତୁ।
ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା		ମେଣ୍ଟା ଓ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଭଜ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପାଣି ଜମିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କୁକୁଡ଼ା		କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭଜା ଲିଟରକୁ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାନ୍ତୁ। ପରିଷ୍କାର ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପାତ୍ର (ଡ୍ରିଙ୍କର) ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର (ଫିଡର)କୁ ନିୟମିତ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ।

ନୋଡାଲ ଅଫିସର

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା

ବି.ବ୍ର:- ଭାନୀୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ “ମଉସମ”, ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ସୂଚନା ପାଇଁ “ମେଘଦୂତ” ଓ ବିକଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ “ଦାମିନୀ” ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
 କୃଷିରେ ଅଧିକତର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ **ଓୟୁଏଟି କଲିଙ୍ଗ** ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ବିହନ, ଚାରା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଚିପ୍ସ କଲ୍ଚର ଚାରା, ଫଳ ଓ ପତ୍ରପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ , ଅଙ୍ଗୁଳିକା ଯାଆଁ/ ବର୍ଷିକୀୟା ଯାଆଁ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ, ପଶୁ ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜି , ଜୀବାଣୁ ସାର , ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ , ଜିଆ ଓ ଜିଆଖତ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି)।
 ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ର ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଓ କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ସୂଚନା ଏବେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ଆପ ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।
 (Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)