



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



ପତ୍ର ସଂ-୮୦/୨୦୨୨ ସପ୍ତାହ-୪୦ ମଙ୍ଗଳବାର, ତାରିଖ-୦୭.୧୦.୨୦୨୨

ଭବାନୀପାଟଣା କୃଷିପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ର ମୁନିଟ୍ ରେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା :

ସର୍ବମୋଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ (୦୧-୦୧-୨୦୨୨ ଠାରୁ)	୧୩୦୯.୨/୭୩
ସାପ୍ତାହିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ(ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ	୦/୦
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୩୩.୩
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୨୧.୭

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ :

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷାର ପରିମାଣ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ଆକାଶରେ ମେଘର ପରିମାଣ (ଅକଟା)	ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କଳାହାଣ୍ଡି	୦୭-୧୦-୨୦୨୨	୦	୩୪	୨୨	୦	୮୭	୪୧	୪	୯୦
	୦୮-୧୦-୨୦୨୨	୧	୩୪	୨୨	୧	୮୮	୪୨	୪	୯୦
	୦୯-୧୦-୨୦୨୨	୦	୩୩	୨୩	୦	୯୦	୪୪	୫	୨୦୫
	୧୦-୧୦-୨୦୨୨	୦	୩୩	୨୩	୦	୮୮	୪୧	୩	୧୯୪
	୧୧-୧୦-୨୦୨୨	୦	୩୩	୨୩	୦	୮୭	୩୭	୩	୯୦

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍.#୦୬୭୪ - ୨୫୯୨୧୧୭

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର/ସତର୍କ ସୂଚନା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଉପରୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ପୂର୍ବ ରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩ ରୁ ୦୪ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୩ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୩ ରୁ ୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୨ ରୁ ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୭ ରୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୩୭ ରୁ ୪୪ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ।

ଟେଡାବନୀ : ନାହିଁ

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପରାମର୍ଶ

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

- ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶୁଖିଲା ପାଗ ଘାସ ବାଛିବା, ଆନ୍ତଃ-ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ତେଣୁ ଫସଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ରୋଗପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।
- ଶୁଖିଲା ପାଗ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଟିଯାଇଥିବା ଖରିଫ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ଷତିରୁ ବର୍ତ୍ତବା ପାଇଁ ଅମଳ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ ଶୁଖିଲା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ମାଟିରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରତାର ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାବାମ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏବଂ ପନିପରିବା ଭଳି ଋତୁ ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବୁଣାବୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ।
- ଧାନ, କପା, ତାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛିଡ଼ା ଫସଲରେ ଶୋଷକ ପୋକ, କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବକରା ବିନ୍ଧା ପୋକ ଏବଂ କବକଜନିତ ରୋଗ ପାଇଁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସମ୍ପର୍କିତ ପରିଚାଳନା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତା		ଜମିରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି / ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସମୟରେ ଯବକ୍ଷାରଜୀନ ଯୁକ୍ତ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଫସଲ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରାମର୍ଶ		
ଫସଲ ର ନାମ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	ପରାମର୍ଶ
କ୍ଷେତ୍ର ଫସଲ		
ଖରିଫ ଧାନ	ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା ରୁ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା : ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ସମୟରେ ଉପ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୬ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ + ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଓ ଖାଲୁଆ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ + ୧୩ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି ଦିତୀୟ ଦଫା ସାର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମହିଷା ରୋଗ : ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ଛାଡ଼ି ଧାନରେ ମହିଷା/କ୍ଲାସ୍ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ଗ୍ରାମ୍ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୫୦% + ଟ୍ରାଇକୋଫ୍ଲୋଷ୍ଟେବିନ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି. (Tebuconazole 50% +



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଣ୍ଡିତ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



		Trifloxystrobin 25% WG) କିମ୍ବା ୩୦୦ ମିଲିଲିଟର ଆଇସୋପ୍ରୋଥାଲେନ୍ ୪୦% ଇ.ସି. (Isoprothiolane 40% EC) କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରାଳରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ▪ ପତ୍ରାଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ : ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଏହି ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୫୦ % + ଟ୍ରାକ୍ଲୋକ୍ସିସ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୨୫ % ଡବ୍ଲୁ.ଜି. ୮୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫ % ଇ.ସି କୁ ୨୦୦ ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ▪ ବାଜାଣ୍ଡ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା: ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ବାଜାଣ୍ଡ ଜନିତ ପତ୍ରପୋଡ଼ା / ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଲିଫ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ରୋଗର ପ୍ରାବୃତ୍ତାବ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କପର୍ ଓକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି. କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ▪ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି / ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ: ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ / ବି.ପି.ଏଚ୍ (BPH) ଏବଂ ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ / ଡବ୍ଲୁ.ବି.ପି.ଏଚ୍ (WBPH) ର ପ୍ରାବୃତ୍ତାବ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଯଦି ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିସୀମା / ଇ.ଟି.ଏଲ୍ (ଗୋଛି ପ୍ରତି ୫-୧୦ ଟି ପୋକ) ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଜମାଇ ନରଖି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜମି ଓବା ଓ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି ସମସ୍ୟା ଲାଗିରହେ, ତେବେ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ: 1. ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି (Pymetrozine 50% WG) @ ୧୨୦ ଗ୍ରାମ୍, କିମ୍ବା 2. ଡିନୋଟେଫୁରାନ୍ ୨୦% ଏସ୍.ଜି (Dinotefuran 20% SG) @ ୮୦ ଗ୍ରାମ୍, କିମ୍ବା 3. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍ (Imidacloprid 17.8% SL) @ ୫୦ ମିଲି, କିମ୍ବା 4. ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ୍ ୨୦% + ଏସିଫେଟ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି (Buprofezin 20% + Acephate 50% WP) @ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍, କିମ୍ବା 5. ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି (Flonicamid 50% WG) @ ୬୦ ଗ୍ରାମ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ▪ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି / ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
କପା	ଫୁଲ ରୁ ବକରା ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା	▪ କପା ଫସଲ ୯୦ ଦିନର ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ୧୦୦ ସେ.ମି. ହୋଇଗଲେ ଟୋପିଙ୍ଗ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । (ମୁଖ୍ୟ କାଣ୍ଡର ଅଗ୍ର ଭାଗକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ) । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛର ଉପର ମୁହାଁ ଅବିବୃଦ୍ଧି ରଖି ହେବା ସହ ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ । ▪ ଶୋଷକ କୀଟ (ଜଉ, ଉକୁଶିଆ, ପତ୍ରଡିଆଁ, ଦହିଆ ଓ ଧଳାମାଛି): ବର୍ତ୍ତମାନ ର ପାଗ ଶୋଷକ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୮୦ ଗ୍ରା. ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ଜି କିମ୍ବା ୮୦ ଗ୍ରା. ଥିଓମେଥୋକ୍ସମ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି ନଚେତ ୪୦୦ ମି.ଲି. ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ୍ ୨୫% ଏସ୍.ସି କିମ୍ବା ୨୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ଡାଇଫେନଥୁରିଅନ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ▪ ଡମାଣ୍ଡ ପତ୍ରକଟା ପୋକ: ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିରେ ଡମାଣ୍ଡ ପତ୍ରକଟା ପୋକ / ଟୋବାକୋ କାଟିପିଲାର୍ (Tobacco caterpillar) ର ପ୍ରାବୃତ୍ତାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଏହି ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ଟୋବାକୋ ଲୁଅର୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫେରୋମୋନ୍ ଗ୍ରାପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଲୁଅର୍ କୁ ବଦଳାନ୍ତୁ । ଯଦି ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସୀମା / ଇ.ଟି.ଏଲ୍ ରୁ ଅଧିକ ରହେ, ତେବେ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ସମୟରେ ନୋଭାଲ୍ଡିନ୍ ୮.୮% ଏସ୍.ସି. @ ୨ ମିଲି/ଲିଟର ପାଣି କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାଣ୍ଡାନ୍ଥ୍ରାଲିପ୍ରୋଲ୍ ୧୮.୫% ଏସ୍.ସି. @ ୩ ମିଲି/୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ହରିଡ଼	ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା	▪ ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ସଂକ୍ରମଣ କୁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଫସଲରେ ଶୋଷକ କୀଟ ଯଥା ଜଉ, ପତ୍ର ଡିଆଁ ଓ ଉକୁଶିଆ ପୋକର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ଥିଓମେଥୋକ୍ସମ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି କିମ୍ବା ୬୦ ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍ କୁ ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ▪ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ ମେଟିରାମ୍ ୭୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି		



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଣ୍ଡିତ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



କୋବି ଜାତୀୟ ପରିପରିବା (ପୁଲକୋବି, ପତ୍ରକୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି)	ନର୍ସରୀ	ନର୍ସରୀ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୩ ମିଟର ଲମ୍ବ, ୧ ମିଟର ଓସାର ଓ ୧୫-୨୦ ସେ.ମି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପଟାଳି ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ପଟାଳି ପିଛା ୧୫ ରୁ ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସଜା ଗୋବର ଖତ ଓ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫୋସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଏକର ଜାଗା ଚାଷ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କିସମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୦୦ ରୁ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ସଂକର କିସମ (ହାଇବ୍ରିଡ୍) କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୦୦ - ୧୫୦ ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ବରକାର ପଡ଼ିଥାଏ।
ପିଆଜ	ନର୍ସରୀ	ନର୍ସରୀ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୩ ମିଟର ଲମ୍ବ, ୧ ମିଟର ଓସାର ଓ ୧୫-୨୦ ସେ.ମି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପଟାଳି ମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର ସାତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ପଟାଳି ପିଛା ୧୫ ରୁ ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ସଜା ଗୋବର ଖତ ଓ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫୋସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଏକର ଚାଷ ପାଇଁ ୪-୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ୫୦ ବର୍ଗ ମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ନର୍ସରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଝାଉଳା ଓ ମୁଳସଜା ରୋଗର ପ୍ରତିକ୍ଷେପକ ରୂପେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ କୁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ସ୍ପ୍ରେପଟୋସାଲ୍‌କ୍ଲିନ୍ ଓ ୧୦ ଗ୍ରାମ କର୍ବେନଡାଜିମ୍ କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ନର୍ସରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଟାଳି କୁ ଭିୟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ କିସମ: ଏଗ୍ରୀ ଫାଉଣ୍ଡ ଲାଇଭ୍ ରେଡ୍, ଭୀମା ସୁପର, ଭୀମା ରେଡ୍, ଭୀମା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି।
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ		
ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି		ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ କୁ ଦେଖି ଆଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଗୃହାଳରେ ଉତ୍ତମ ପବନ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାବାସ୍ଥା କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନାପିଆର ପରି ଘାସ କୁ ଚାଷୀ ମାନେ ଚାଷ କରି ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା		ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧତା, ତାପ ତାପ ଓ ପରଜୀବି ସଂକ୍ରମଣ ର ଲକ୍ଷଣ ଜାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କୃମି ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ । ଫାଟୁଆ ଓ ଛେଳି ମଡ଼କ ପରି ସାଧାରଣ ରୋଗ ବିରୋଧ ରେ ଟିକା କରଣ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କୁକୁଡ଼ା		କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ମାନେ ଡିପ ଲିଟର ପ୍ରଣାଳୀ ମାଂସ ପାଇଁ ପାଳନ କରୁଥିବା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଓ ତାପମାତ୍ରା କୁ ଆୟତ ରେ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ନୋଡାଲ ଅଫିସର

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା

ବି.ବ୍ର:- ଭାନୀୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ “ମଉସମ”, ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ସୂଚନା ପାଇଁ “ମେଘସୂଚ” ଓ ବିଜୁଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ “ବାନିନୀ” ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୃଷିରେ ଅଧିକତର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ **ଓୟୁଏଟି କଲିଙ୍ଗ** ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ବିହନ, ଚାଉଳ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଟିସୁ କଲ୍ଚର ଚାଉଳ, ଫଳ ଓ ପରିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉପାଦ, ଅଳ୍ପବିକା ଯାଆଁଳ/ ବର୍ଷିକୀୟା ଯାଆଁଳ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ, ପଶୁ ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜି , ଜୀବାଣୁ ସାର , ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ , ଜିଆ ଓ ଜିଆଖତ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି)।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ର ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଓ କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ସୂଚନା ଏବେ ଉତ୍ତମ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମେଘସୂଚ ଆପ ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପ ତାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।
(Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)