



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



ପତ୍ର ସଂ-୨୩/୨୦୨୨ ସପ୍ତାହ-୩୨ ଶୁକ୍ରବାର, ତାରିଖ-୦୭.୦୮.୨୦୨୨

ଭବାନୀପାଟଣା କୃଷିପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ର ମୁନିଟ ରେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା :

ସର୍ବମୋଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ (୦୧-୦୧-୨୦୨୨ ଠାରୁ)	୨୮୯.୭/୩୫
ସାପ୍ତାହିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ(ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ	୭୯.୨/୦୩
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୩୩.୪
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୨୪.୯

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ :

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷାର ପରିମାଣ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ଆକାଶରେ ମେଘର ପରିମାଣ (ଅକଟା)	ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କଳାହାଣ୍ଡି	୦୮-୦୮-୨୦୨୨	୩୮	୩୨	୨୩	୮	୯୩	୭୩	୬	୨୨୦
	୦୯-୦୮-୨୦୨୨	୧୪	୩୩	୨୪	୭	୯୧	୭୩	୭	୨୪୧
	୧୦-୦୮-୨୦୨୨	୮	୩୩	୨୫	୫	୯୧	୬୭	୮	୨୩୯
	୧୧-୦୮-୨୦୨୨	୭	୩୩	୨୫	୫	୯୦	୬୪	୯	୨୩୭
	୧୨-୦୮-୨୦୨୨	୫	୩୪	୨୫	୭	୮୯	୬୪	୯	୨୪୨

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍.#୦୬୭୪ - ୨୫୯୧୧୧

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର/ସତର୍କ ସୂଚନା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଉପରୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା (୫ ରୁ ୩୮ ମିମି/ଦିନ) ଏବଂ ଶେଷଭାଗ ଆଡ଼କୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ର ପରିମାଣ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଶ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡ଼ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୬ ରୁ ୯ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୩୨ ରୁ ୩୪° ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୩ ରୁ ୨୫° ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୯ ରୁ ୯୩% ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୬୪ ରୁ ୭୩% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ।

ଟେଡାବନୀ : ଆଗାମୀ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟିବା ପବନ ବହିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାଛଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି (ଆସନ୍ତା କାଲି ସକାଳ ୮.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ) ।

ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ:

- **ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୦୭ ଅଗଷ୍ଟ ରୁ ୧୩ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୨):** ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ଏହି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସାଇକ୍ଲୋନେନେସିସ୍ / ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
- **ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୧୪ ଅଗଷ୍ଟ ରୁ ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୨):** ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକରୁ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସାଇକ୍ଲୋନେନେସିସ୍ / ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପରାମର୍ଶ

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

- ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବର୍ଷା ନକମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଜଳବନ୍ଧୀ ଜମିର ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପନିପରିବା, ତାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଚୈଳବୀଜ, କପା ଏବଂ ଫଳ ବଗିଚା ସମେତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଫସଲ ଜମିରେ ଉତ୍ତମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
- ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ରୋଗର ପ୍ରାଦୂର୍ଭାବ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ତେଣୁ ନିୟମିତ ଫସଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ସ୍ତ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ।
- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପନିପରିବା ନର୍ସରୀ/ତଳିଘରକୁ ପଲିଥିନ୍ ଛାଉଣି କରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଗୋରୁଗାଈ ଓ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖିଲା ଦାନା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା		ଧାନ ରୋଇବାର ୧ ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଘାସ/ଅଗାଛା ବମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବେନସଲ୍‌ଫ୍‌ସରନ୍ ମିଆଇଲ୍ ୦.୨% + ପ୍ରେଟିଲ୍‌କ୍ଲୋର ୨% ଜିଆର କୁ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ଫସଲ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ		
ଫସଲ ର ନାମ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	ପରାମର୍ଶ
କ୍ଷେତ୍ର ଫସଲ		
ଖରିଫ ଧାନ	ପିଲ / ତଳି/ ରୁଆ ଅବସ୍ଥା	ବୁଣା ଧାନ : ଘାସ ପରିଚାଳନା : ଗଜା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ ଧାନ ବୁଣିବା ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୪୦ ରୁ ୨୬୦ ମି.ଲି. ଫେନୋକ୍ସାପ୍ରୋପ୍ ପି ଇଆଇଲ୍ ୧୦% ଇ.ସି. କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟମ ଓ ଖାଲ ଜମିରେ ଯେଉଁଠି ଘାସ ମରା ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନାହିଁ ୩ ରୁ ୪ ଇଞ୍ଚ ପାଣି ଜମିରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବେଉଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବଢାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଖେଳୁଆ କରନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା : ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଖାଲ ଜମିରେ ବେଉଷଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପାଲି ସାର ଭାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ୩୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ମୂରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପାଣି ଗଳିଯିବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ବୋହିଯିବା ରୋକିବା ପାଇଁ ଜମିର ହୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମରାମତି କରିନିଅନ୍ତୁ । ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଜମିରେ ବତର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋ୪ ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରୁ ପାଣି ଯେପରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଯାଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ରୁଆ ଧାନ : ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା : ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କିଣ୍ଟାଲ ସଜା ଗୋବର ଖତ କୁ ମାଟିରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ଜମିରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ଛିପ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୨ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି + ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଓ ଖାଲୁଆ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକର ପ୍ରତି ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି + ୨୨ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମାଟିରେ ଜିଙ୍କ୍ ଏବଂ ବୋରୋନ ଅଣୁସାର ର ଅଭାବ ଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ୪ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବୋରାକ୍ସ (୧୦.୫% ବୋରୋନ) ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନର ତଳି କୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ବୁଦା ପ୍ରତି ୨-୩ ଟି ଚାଉ ଏବଂ ଗଛ ରୁ ଗଛ ଦୂରତା ୬ ଇଞ୍ଚ ଓ ଧାଡ଼ି ରୁ ଧାଡ଼ି ଦୂରତା ୮ ଇଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଧାଡ଼ି ରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରନ୍ତୁ । ଘାସ ପରିଚାଳନା : ଗଜା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବେନସଲ୍‌ଫ୍‌ସରନ୍ ମିଆଇଲ୍ ୦.୨% + . ପ୍ରେଟିଲ୍‌କ୍ଲୋର ୨% ଜି.ଆର କୁ ୨୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ରୋଇବାର ୧ ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
କପା	ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	- ଜମିରୁ ବଳକା ବର୍ଷାପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । - କପା ଫସଲ ତିନି ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲେ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର/ହାଇଡ୍ରାଟ କିସମ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ମୂରିଆ ସହିତ ୨୪ କି.ଗ୍ରା ଏମ.ଓ.ପି. ସାର ଓ ଉତ୍କଟ କିସମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. . ମୂରିଆ ସହିତ ୧୮ କି.ଗ୍ରା ଏମ.ଓ.ପି. ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । - ଫୁଲ ଓ କଢ ଝଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୩.୫ ମି.ଲି. ପ୍ଲାନୋଫିକ୍ସ ହରମୋନ୍ କୁ ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ କରି ଲଗାଇବାର ୩୦ ରୁ ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ହରଡ଼	ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	- ଜମିରୁ ବଳକା ବର୍ଷାପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । - ଫସଲରେ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ କ୍ଷେତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ଜଉପୋକ (ଆଫିଡ଼) ଏବଂ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଭଳି ଶୋଷକ ପୋକଙ୍କ ବାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (୧୫୦୦ ppm) ଲିଟର ପ୍ରତି ୩ ମି.ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଘାସ ପରିଚାଳନା : ଏକର ପ୍ରତି ୩୦୦ ମି.ଲି. ଇମାଜେଥାପିର୍ ୧୦% ଏସ୍.ଏଲ୍ (Imazethapyr 10% SL) କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିହନ ବୁଣିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ମକା	ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	ନୀଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମକା ଜମିରୁ ବଳକା ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ । ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ସଂକ୍ରମଣ କୁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମିତ ଗଛ କୁ ଓପାଡ଼ି ଜମି ଠାରୁ ଦୂରକୁ



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଣ୍ଡିତ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



		ନେଇ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ । କୀଟ ପରିଚାଳନା: - ଶୋଷକ କୀଟ ଯଥା ଜରୁ ଓ ଉକୃଷିଆ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ମିଲିଗ୍ରାମ ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (୧୫୦୦ ପିପିଏମ୍) ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କୀଟବିକ୍ଷା ପୋକ: ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪୦୦ ମି.ଲି. ଫିପ୍ରୋନିଲ ୫% ଏସ.ସି. କିମ୍ବା ପ୍ରୋପେନୋଫୋସ ୫୦% ଇ.ସି କୁ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଫଳ ଆର୍ମି ୱର୍ମ: ଏହି କୀଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୮୦ ଗ୍ରା. ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେନଜୋଏଟ୍ ୫% ଏସ.ଜି. କୁ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି		
ଚମାଟୋ	ବୁଣିବା ଅବସ୍ଥା	- ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅଟେ । ଉପଯୁକ୍ତ ଉନ୍ନତ କିସମ: ଉତ୍କଳ କୁମାରୀ (ବିଟି-୧୦), ଉତ୍କଳ ଦିପ୍ତି (ବିଟି-୨), ଉତ୍କଳ ରାଜା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଉତ୍କଳ କୁମାରୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦ ସଙ୍କର ଜାତୀୟ କିସମ: ଅର୍କ ସମ୍ରାଟ, ଅର୍କ ରକ୍ଷକ, ଅର୍କ ଅଭେଦ, ପୁସା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ୧, ପୁସା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ୨, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି । ଆବଶ୍ୟକ ବିହନ: ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କିସମରେ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନିମନ୍ତେ ୫୦ ରୁ ୨୦ ମଞ୍ଜି ର ତଳି ଆବଶ୍ୟକ ।
କଦଳୀ	ଅଙ୍ଗୀୟା/ଫଳ ଅବସ୍ଥା	ସମ୍ପ୍ରତି ପାଗରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ କଦଳୀ ଗଛରେ ସିଗାଟୋକା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ସିଗାଟୋକା ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଏବଂ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପତ୍ର କୁ ଅଲଗା କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ । କଦଳୀ ବାଡ଼ି ରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବ । ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାର୍ବେନ୍‌ଡିମ୍ ଓ ମାଙ୍କୋଜେବ ର ମିଶ୍ରିତ ଫିଫିନାଶକ କୁ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଅଥବା ପ୍ରୋପିକୋନାୟୋଲ ୨୫% ଇସି ୧ ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଚା ୦.୫ ମିଲି ଆଡ଼ଜୁଭାଣ୍ଟ ମିଶ୍ରଣ କରି ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ		
ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି		ଗାଈ ଓ ମଇଁଷିକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରେ ନବାନ୍ଧି ଗୃହାଳ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଖୁରା ଜନିତ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ । ଗୃହାଳର ଚଟାଣ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ଉପରେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଆନ୍ତୁ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ଟାର ରୋଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ଜଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ ।
ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା		ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କୃମି ମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ଘାସ, ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା କିମ୍ବା ଦାନା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
କୁକୁଡ଼ା		ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥରୀକୃତ ବୃତ୍ତିକ ଡାପମାତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ଘରେ ବିଛା ଯାଉଥିବା ଚଷ୍ମୁ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ ଓ ଇନ୍‌ଫ୍ଲୁରେନ୍ସ ଲାଇଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ଦାନା କୁ ଶୁଖିଲା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଚାହା ଯେମିତି ଓଦା ନହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହନ୍ତୁ । ସଠିକ୍ ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଟୀକାକାରଣ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ଭିଟାମିନ ସି ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ନୋଡାଲ ଅଫିସର

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା

ବି.ଦ୍ର:- ଭାନୀୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ “ମଉସମ”, ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ସୂଚନା ପାଇଁ “ମେଘଦୂତ” ଓ ବିକୃଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ “ଦାନିନୀ” ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କୃଷିରେ ଅଧିକତର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ **ଓୟୁଏଟି କଲିଙ୍ଗ** ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ବିହନ, ଚାରା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଟିପ୍ପୁ କଲ୍ଚର ଚାରା, ଫଳ ଓ ପରିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ଅନୁକୃତିକ ଯାଆଁ/ ବର୍ଷିକୀୟା ଯାଆଁ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ, ପଶୁ ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜି, ଜୀବାଣୁ ବାଧ, ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ , ଜିଆ ଓ ଜିଆଖଟ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି) ।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ର ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଓ କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ସୂଚନା ଏବେ ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ଆପ ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପ ତାହାରଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।

(Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)