



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



ପତ୍ର ସଂ-୨୭/୨୦୨୨ ସପ୍ତାହ-୩୩ ମଙ୍ଗଳବାର, ତାରିଖ-୧୮.୦୮.୨୦୨୨

ଭବାନୀପାଟଣା କୃଷିପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ର ମୁନିଟ୍ ରେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା :

ସର୍ବମୋଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ (୦୧-୦୧-୨୦୨୨ ଠାରୁ)	୭୮୪.୭/୪୧
ସାପ୍ତାହିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ(ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ	୫୮.୦/୦୪
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୩୦.୧
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୨୪.୭

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ :

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷାର ପରିମାଣ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ଆକାଶରେ ମେଘର ପରିମାଣ (ଅକଟା)	ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କଳାହାଣ୍ଡି	୧୯-୦୮-୨୦୨୨	୨୦	୨୮	୨୪	୮	୯୨	୭୮	୧୦	୧୪୭
	୨୦-୦୮-୨୦୨୨	୧୨	୨୯	୨୩	୫	୯୩	୭୩	୧୦	୨୪୨
	୨୧-୦୮-୨୦୨୨	୧୨	୩୦	୨୩	୬	୯୨	୭୧	୯	୨୩୯
	୨୨-୦୮-୨୦୨୨	୧୨	୨୯	୨୪	୭	୯୩	୭୨	୯	୨୩୯
	୨୩-୦୮-୨୦୨୨	୧୨	୩୦	୨୪	୭	୯୩	୭୮	୯	୨୩୦

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍.#୦୬୭୪ - ୨୫୯୨୧୧୭

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର/ସତର୍କ ସୂଚନା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଉପରୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା (୧୨ ରୁ ୨୦ ମିମି/ଦିନ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଶ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ କିମ୍ବା ମେଘାଞ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୯ ରୁ ୧୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୨୮ ରୁ ୩୦° ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୩ ରୁ ୨୪° ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୯୨ ରୁ ୯୩% ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୭୮ ରୁ ୭୯% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ।

ଟେଡାବନୀ : ନାହିଁ (୨୩.୦୮.୨୦୨୨ ସକାଳ ୮.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ)

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପରାମର୍ଶ

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

- ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେଣୁ, ଚାଷୀଭାଇମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ଘାସ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ଏବଂ ଫସଲର ସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଗ ନିର୍ମଳ/ଶୁଖିଲା ଥିବା ସମୟରେ ଘାସ ବାଛିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଡ଼ାଖୋସା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ।
- ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା/ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀରେ ଓଦାପଣ ଯୋଗୁଁ ଫସଲରେ ପୋକ ଏବଂ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଉପାଦି ଜମିଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହର କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ଝାଉଁଳା ଏବଂ ଚେର ସହା ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ, ପାଗ ଶୁଖିଲା/ନିର୍ମଳ ଥିବା ସମୟରେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ମେଟାଲାଇଟ୍ ୮% + ମ୍ୟାଙ୍କୋଜେବ୍ ୬୪% ଡବ୍ଲୁ.ପି. ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା		ଜଳବନ୍ଧୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲର ପତ୍ର ଲାଲିପଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାଙ୍କୋଜେବ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ ଏବଂ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମୁରିଆ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଫସଲ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ		
ଫସଲ ର ନାମ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	ପରାମର୍ଶ
କ୍ଷେତ୍ର ଫସଲ		



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



ଖରିଫ ଧାନ	ପିଲ ଅବସ୍ଥା	ବୁଣା ଧାନ : କୀଟ ପରିଚାଳନା : ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସକ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିହନ ବୁଣିବାର ୩୦ ଦିନ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ଫେରୋମୋନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ ୧ ଟି ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର/ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଲଗାନ୍ତୁ । ପ୍ରତି ୩ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫେରୋମୋନ୍ ଲିଓର୍ କୁ ବଦଳାନ୍ତୁ । ରୁଆ ଧାନ : ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା : ପ୍ରଥମ ବତ୍ତା ସାର ହିସାବରେ ଜିପ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଓ ଖାଲୁଆ ଜମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୮ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ସାର ପିଲ ବାହାରିବା ସମୟରେ (ରୋଇବାର ୨୧ ରୁ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଘାସ ପରିଚାଳନା : ଗଜା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ- - ସଫଳ ଗଜା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରୋଇବାର ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ପାଇରାମୋସୁଲ୍‌ଫୁରନ ଇଥାଲଲ୍ ୧୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ରୋଇବାର ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୨୦ ମି.ଲି. ବିସ୍ଫାଘରିବାକ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ୧୦% ଏସ.ସି. କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ କରି ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ଧାନ ରୋଇବାର ୨୫ ରୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ/ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୪୦-୨୬୦ ମିଲିଲିଟର ଫେନୋକ୍ସାପ୍ରପି-ଇଥାଲଲ୍ ୧୦% ଇ.ସି. କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
କପା	ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	- ଜମିରୁ ବଳକା ବର୍ଷାପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । - କପା ଫସଲ ତିନି ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲେ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର/ହାଇକ୍ରିଡ କିସମ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ସହିତ ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି. ସାର ଓ ଉତ୍ତମ କିସମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ସହିତ ୧୮ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି. ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । - ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଅଣୁସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ହୁଡ଼ା ଟେକିବା ସମୟରେ ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ୨ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବୋରାକ୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । - ଫୁଲ ଓ କଢ ଝଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ୩.୫ ମି.ଲି. ପ୍ଲାମୋଫିକ୍ସ୍ ହରମୋନ୍ କୁ ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ କରି ଲଗାଇବାର ୩୦ ରୁ ୪୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । - ଜଳବନ୍ଧୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲର ପତ୍ର ଲାଲିପଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ୟୁରିଆ ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ମକା	ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	- ନୀଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମକା ଜମିରୁ ବଳକା ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ । ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକର ସଂକ୍ରମଣ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମିତ ଗଛ କୁ ଓପାଡ଼ି ଜମି ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ । ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା : ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ଗଜା ହେବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ଏବଂ ୪୦-୪୫ ଦିନ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କୀଟ ପରିଚାଳନା: ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ବିଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ । କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକ: ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪୦୦ ମି.ଲି. ଫିପ୍ରୋନିଲ ୫% ଏସ.ସି. କିମ୍ବା ପ୍ରୋପେନୋଫୋସ ୫୦% ଇ.ସି କୁ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଫଲ ଆର୍ମି ୱର୍ମ: ଏହି କୀଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୮୦ ଗ୍ରା. ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେନଜୋଏଟ୍ ୫% ଏସ.ଜି. କୁ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି		
ଚମାଚୋ	ବୁଣିବା ଅବସ୍ଥା	- ଗରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅଟେ । ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ କିସମ: ଉତ୍କଳ କୁମାରୀ (ବିଟି-୧୦), ଉତ୍କଳ ଦିପ୍ତି (ବିଟି-୨), ଉତ୍କଳ ରାଜା, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଜ୍ଞା, ଉତ୍କଳ କୁମାରୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦ ସଙ୍କର ଜାତୀୟ କିସମ: ଅର୍କ୍ ସମ୍ରାଟ, ଅର୍କ୍ ରକ୍ଷକ, ଅର୍କ୍ ଅଭେଦ, ପୁଷା ହାଇକ୍ରିଡ ୧, ପୁଷା ହାଇକ୍ରିଡ ୨,



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଣ୍ଡିତ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



		ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି । ଆବଶ୍ୟକ ବିହନ: ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କିସମରେ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ ନିମନ୍ତେ ୫୦ ରୁ ୨୦ ମଞ୍ଜି ର ତଳି ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ	ବୁଣିବା ଅବସ୍ଥା	- ଆଫ୍ରିକୀୟ ଗେଣ୍ଡୁ (African marigold) ଚାଷ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ଏହାର ଉନ୍ନତ କିସମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜାଏଣ୍ଟ ବଲ୍, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଯେଲୋ, ଅଲ୍ ଯେଲୋ, ଅଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ବ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡ । - ଚାଉଁ ରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୨୦ ଟନ୍ ସବୁଜ ଗୋବର ଖତ ସହିତ ୪୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପୋଟାସ୍ କୁ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ । - ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ୨୫ ରୁ ୩୦ ଦିନର ନୀରୋଗ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଚାଉଁ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ ।
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ		
ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି		ଗାଈ ଓ ମଇଁଷିକୁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବାହାରେ ନବାନ୍ଧି ଗୃହାଳ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଖୁରା ଜନିତ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ । ଗୃହାଳର ଚଟାଣ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ଉପରେ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଆନ୍ତୁ । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଗ ରୋଗ ବାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ଜଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ ।
ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା		ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା ମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କୃମି ମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ବର୍ଷା ସମୟରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ଘାସ, ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା କିମ୍ବା ଦାନା ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
କୁକୁଡ଼ା		ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥରୀକୃତ ବୃତ୍ତିତ୍ୱ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସଠିକ ରଖନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ଘରେ ବିଛା ଯାଉଥିବା ଚଷ୍ମୁକୁ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ ଓ ଇନ୍ଫରାରେଡ଼ ଲାଇଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କୁକୁଡ଼ା ଦାନା କୁ ଶୁଖିଲା ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଚାହା ଯେମିତି ଓଦା ନହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହନ୍ତୁ । ସଠିକ ସମୟରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଟୀକାକାରଣ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ, ଭିଟାମିନ ସି ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ନୋଡାଲ ଅଫିସର

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା

ବି.ବ୍ର:- ଭାନୀୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ “ମଉସମ”, ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ସୂଚନା ପାଇଁ “ମେଘଦୂତ” ଓ ବିଜୁଳି ସର୍ବତ୍ର ସୂଚନା ପାଇଁ “ବାମନୀ” ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

କୃଷିରେ ଅଧିକତର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ **ଓୟୁଏଟି କଲିଙ୍ଗ** ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ବିହନ, ଚାଉଁ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଟିସୁ କଲ୍ଚର ଚାଉଁ, ଫଳ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ, ଅନୁକୂଳ ଯାଆଁ/ ବର୍ଷିକାୟା ଯାଆଁ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ, ପଶୁ ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜି , ଜୀବାଣୁ ସାର , ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ , ଜିଆ ଓ ଜିଆଖତ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି) ।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ର ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଓ କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ସୂଚନା ଏବେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ଆପ ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପ ତାହାରଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।

(Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)