



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



ପତ୍ର ସଂ-୭୭/୨୦୨୨ ସପ୍ତାହ-୩୮ ଶୁକ୍ରବାର, ତାରିଖ-୨୫.୦୯.୨୦୨୨

ଭବାନୀପାଟଣା କୃଷିପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ର ମୁନିଟ୍ ରେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା :

ସର୍ବମୋଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ (୦୧-୦୧-୨୦୨୨ ଠାରୁ)	୧୨୯୫.୪/୨୨
ସାପ୍ତାହିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ(ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ	୧୫୯.୨/୦୫
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୩୦.୭
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୨୪.୨

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ :

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷାର ପରିମାଣ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ଆକାଶରେ ମେଘର ପରିମାଣ (ଅକଟା)	ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କଳାହାଣ୍ଡି	୨୭-୦୯-୨୦୨୨	୨୫	୨୮	୨୪	୭	୯୨	୮୦	୧୭	୧୯୭
	୨୭-୦୯-୨୦୨୨	୧୦	୨୯	୨୪	୬	୯୩	୬୭	୧୮	୨୧୨
	୨୮-୦୯-୨୦୨୨	୫	୩୦	୨୫	୫	୯୪	୬୦	୬	୨୦୮
	୨୯-୦୯-୨୦୨୨	୫	୩୦	୨୫	୪	୯୪	୬୧	୪	୨୧୪
	୩୦-୦୯-୨୦୨୨	୪	୩୦	୨୫	୪	୯୨	୫୭	୩	୨୨୦

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍.#୦୬୭୪ - ୨୫୯୨୧୧୭

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର/ସତର୍କ ସୂଚନା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଉପରୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା (୪ ରୁ ୨୫ ମିଲିମିଟର/ଦିନ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶ ସାଧାରଣତଃ ମେଘାଢ଼ି ରହିବ, ଏହା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇ ଦିନ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷିଣ ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩ ରୁ ୧୭ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୨୮ ରୁ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୯୨ ରୁ ୯୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୫୭ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି: ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଅବପାତ, ଗତ ୦୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୫ କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି, ଆଜି ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨, ସକାଳ ୦୮:୩୦ IST ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି, ଏହାର ଅକ୍ଷାଂଶ ୨୦.୯° ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ୮୨.୪° ପୂର୍ବ ନିକଟରେ, ଯାହା ଦୁଆପଡ଼ା (ଓଡ଼ିଶା) ର ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ନିକଟରେ ଏବଂ ରାୟପୁର (ଛତିଶଗଡ଼) ର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ କିମି, ଚମ୍ପା (ଛତିଶଗଡ଼) ର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରୁ ୧୩୦ କିମି ଏବଂ ବିଲାସପୁର (ଛତିଶଗଡ଼) ର ଦକ୍ଷିଣରୁ ୧୪୦ କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଅବପାତ ର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ାଇ ରଖିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଲମ୍ବୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ଟେଡାବନୀ : ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ ରୁ ୫୦ କି.ମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା (୨୭.୦୯.୨୦୨୨ ସକାଳ ୦୮:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ) ।

ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ:

- **ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ (୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରୁ ୦୧ ଅକ୍ଟୋବର , ୨୦୨୨):** ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
- ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।**
- **ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ (୦୨ ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ୦୮ ଅକ୍ଟୋବର , ୨୦୨୨):** ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପରାମର୍ଶ

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

- ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଜମିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ସହ ବର୍ଷା ନିକମିବା ଏବଂ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



- କପା, ମକା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ଆଖୁ ଏବଂ ପନିପରିବା ଭଳି ଛିଡ଼ା ଫସଲରେ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷାଜଳର ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧମୁକ୍ତ ଓ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ।
- ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ନୂତନ ଫଳ ଚାରା ଓ ପନିପରିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟି ଦେଇ ଭେରା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କିମ୍ବା ଭଲିପଡ଼ିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ।
- ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି/ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତା		ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଧାନ ପାଟିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ, କ୍ଷେତରେ ଗଜା ହେବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ୨% ଲୁଣ ପାଣି ଦ୍ରବଣ (ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ଗ୍ରାମ ଲୁଣ) ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଫସଲ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପରାମର୍ଶ		
ଫସଲ ର ନାମ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	ପରାମର୍ଶ
କ୍ଷେତ୍ର ଫସଲ		
ଖରିଫ ଧାନ	ପିଲ ବାହାରିବା ରୁ ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା	- ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ଧାନରେ ଗନ୍ଧି ପୋକ, କେଣ୍ଡା ଅଷ୍ଟପଦୀ, କେଣ୍ଡାକଟା ପୋକ, ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି/ଚକଡ଼ା ପୋକ ଏବଂ ମୂଳ ସତ୍ତା, ପତ୍ରାଛାଦ ସତ୍ତା, ପତ୍ରାଛାଦ ପୋଡ଼ା ଓ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ଚାଷୀଭାଇମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । - ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ବିଶିଷ୍ଟ ଧାନ ପାଟିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଧାନ, କ୍ଷେତରେ ଗଜା ହେବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ୨% ଲୁଣ ପାଣି ଦ୍ରବଣ (ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨୦ ଗ୍ରାମ ଲୁଣ) ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରାଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ : ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଏହି ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୫୦ % + ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୁକ୍ସେଟ୍ରିବ୍ ୨୫ % ଡବ୍ଲୁ.ଜି. ୮୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫ % ଇ.ସି କୁ ୨୦୦ ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
କପା	ଫୁଲ ରୁ ବକରା ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା	- ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । - ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲର ପତ୍ର ଲାଲିପଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲ୍ଫେଟ୍ ଏବଂ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଯୁରିଆ ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କପାରେ ହଟାଟ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ହୋଇପାରେ । ଅନୁକୂଳ ପାଗରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛରେ ୧୦ ମିଲିଗ୍ରାମ୍ କୋବାଲ୍ଟ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (୧୦ ପିପିଏମ୍) କୁ ୧ ଲିଟର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୩ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳ ଓଦା କରନ୍ତୁ ।
ହରଡ଼	ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	- ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବର୍ଷାଜଳ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । - ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ ମେଟିରାମ୍ ୭୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି		
ଫଳ ଓ ପନିପରିବା	ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ଫଳ ଅବସ୍ଥା	- ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଛର କୋମଳ ଡାଳ/ଅଂଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ଷତ ଦେଇ କବକ ଓ ଜୀବାଣୁଜନିତ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପନିପରିବା ଫସଲରେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ (Plantomycin) + ୨ ଗ୍ରାମ୍ (ମେଟାଲାଇଟ୍ ୮% + ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଜେବ୍ ୬୪% ଡବ୍ଲୁ.ପି.) ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା/ନିର୍ମଳ ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଗଛର ଭଙ୍ଗା ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଅଲଗା କରନ୍ତୁ । ଗଛର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଚେରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୂଳ ଭାଗରେ ମାଟି ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ । - ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ		
ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି		ଗାଈ ଓ ମଇଁଷିଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଗୁହାଳରେ ରଖନ୍ତୁ; ଶୁଖିଲା ଶଯ୍ୟା, ପରିଷ୍କାର ପାଣି ଓ ଭଲମାନର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ସମୟରେ ଚରାଇବାକୁ ନେବେ ନାହିଁ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଓଦା ପରିବେଶ ଓ



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



	ଅଣ୍ଡା ପବନର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ, ମାଷ୍ଟାଇଟିସ୍ ଓ ଖୁରଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ; ତେଣୁ ଗୁହାଳ ଚାରିପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ।
ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା	ମେଣ୍ଟା ଓ ଛେଳିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଓ ଶୁଖିଲା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡାଜନିତ ସମସ୍ୟା, ନିମୋନିଆ ଓ ଖୁର ରୋଗକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ; ଖାଦ୍ୟକୁ ବର୍ଷାଋତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଜଳମୟ ସ୍ଥାନରେ ଚରାଇବେ ନାହିଁ। ଓଦା ଚଟାଣ ଓ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଫୁଟ୍ ରଟ୍, ଚର୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ପରଜୀବୀଜନିତ ରୋଗବଢ଼ିପାରେ; ତେଣୁ ଶୁଖିଲା ଶଯ୍ୟା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।
କୁକୁଡ଼ା	କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ଶୁଖିଲା ଓ ପ୍ରବଳ ପବନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିବା ଓ ଲିଟର ଓଦା ହେବାକୁ ରୋକନ୍ତୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଅଣ୍ଡା ପବନ ନ ପଡ଼ିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଓ ଓଦା ଲିଟରରେ ଆମୋନିଆ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଓ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ଓଦା ଲିଟର ତୁରନ୍ତ ବଦଳାନ୍ତୁ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ।

ନୋଡାଲ ଅଫିସର

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା

ବି.ଦ୍ର:- ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ “ମଉସମ”, ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ସୂଚନା ପାଇଁ “ମେଘଦୂତ” ଓ ବିଜୁଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ “ବାମିନୀ” ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କୃଷିରେ ଅଧିକତର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ **ଓୟୁଏଟି କଲିଙ୍ଗ** ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ବିହନ, ଚାରା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଟିସୁ କଲ୍ଚର ଚାରା, ଫଳ ଓ ପରିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ , ଅନୁକଳି ଯାଆଁଳ/ ବର୍ଷିକାୟା ଯାଆଁଳ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ, ପଶୁ ପ୍ରଭାତି, ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜି , ଜୀବାଣୁ ସାର , ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ , ଜିଆ ଓ ଜିଆଖତ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି)।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ର ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଓ କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ସୂଚନା ଏବେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ଆପ ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପ ତାହା ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।
(Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)