



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶ୍ଚିମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



ପତ୍ର ସଂ-୨୦/୨୦୨୨ ସପ୍ତାହ-୩୦ ମଙ୍ଗଳବାର, ଚାରିଖ-୨୮.୦୭.୨୦୨୨

ଭବାନୀପାଟଣା କୃଷିପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ର ମୁନିଟ୍ ରେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା :

ସର୍ବମୋଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ (୦୧-୦୧-୨୦୨୨ ଠାରୁ)	୫୩୧.୦/୩୦
ସାପ୍ତାହିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ(ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ	୧୧୩.୦/୦୫
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୨୯.୯
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°C)	୨୪.୪

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ :

ଜିଲ୍ଲା	ଚାରିଖ	ବର୍ଷାର ପରିମାଣ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (°ସେ.)	ଆକାଶରେ ମେଘର ପରିମାଣ (ଅକଟା)	ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କଳାହାଣ୍ଡି	୨୯-୦୭-୨୦୨୨	୪୦	୨୭	୨୨	୮	୯୫	୮୩	୮	୨୪୫
	୩୦-୦୭-୨୦୨୨	୨୫	୨୮	୨୩	୮	୯୪	୮୩	୧୫	୨୪୩
	୩୧-୦୭-୨୦୨୨	୧୫	୩୦	୨୪	୭	୯୦	୭୪	୧୫	୨୦୦
	୦୧-୦୮-୨୦୨୨	୧୦	୩୦	୨୪	୭	୯୧	୭୭	୧୧	୧୯୮
	୦୨-୦୮-୨୦୨୨	୭	୩୦	୨୫	୮	୮୯	୭୩	୮	୨୧୮

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍.#୦୬୭୪ - ୨୫୯୨୧୧୨

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର/ସତର୍କ ସୂଚନା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଉପରୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା (୦୭ ରୁ ୪୦ ମିମି/ଦିନ) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାଶ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରୁ ମେଘାଳୁ ରହିବା ସହିତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦୮ ରୁ ୧୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡୁ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୨୭ ରୁ ୩୦° ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୨ ରୁ ୨୫° ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସକାଳ ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୯ ରୁ ୯୫% ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୭୩ ରୁ ୮୩% ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ରହିଛି ।

ଟେଡାବନୀ : ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଘଠାପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୪୦ ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା (ଆସନ୍ତାକାଳି ସକାଳ ୦୮:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ) ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପରାମର୍ଶ

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

- ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହୋଇଥିବା ଭଲ ବର୍ଷାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ଧାନ ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ।
- ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରିପରିବା ନର୍ସରୀ/ତଳିଘରାକୁ ପଲିଥିନ୍ (Polythene sheet) ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ।
- ଖାଲୁଆ ଜମି ଏବଂ ଫଳ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଜମିବା ଓ ଚେର ସଢ଼ା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।
- ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷା ର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ଅନୁସାରେ (ଭାଗ ଭାଗ କରି) ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ର ସମ୍ଭାବନା କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜମିରୁ ମାତ୍ରାଧିକ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ।
- ପରିବେଶରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (ଶୀତଳାଭାବ) ଯୋଗୁଁ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଫସଲ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ସମୟରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।
- ଗୋରୁଗାଈ ଓ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସଠିକ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନା/ଖାଦ୍ୟକୁ ଓଦା ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
- କାଳବୈଶାଖୀ/ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଘଡ଼ଘଡ଼ି କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ଗଛ ତଳେ ଏବଂ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବଜ୍ରପାତ ସମ୍ଭାବନା ସଠିକ୍ ଓ ସମୟୋପଯୋଗୀ ସୂଚନା ପାଇଁ 'ଦାମିନୀ' (DAMINI) ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା		ଗୋରୁଗାଈ ଓ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସଠିକ୍ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାନା/ଖାଦ୍ୟକୁ ଓଦା ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଫସଲ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ		
ଫସଲ ର ନାମ	ଫସଲ ଅବସ୍ଥା	ପରାମର୍ଶ



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



କ୍ଷେତ୍ର ଫସଲ		
ଖରିଫ ଧାନ	ପିଲ ଅବସ୍ଥା/ ଚଳି ଅବସ୍ଥା	ବୁଣା ଧାନ : ଘାସ ପରିଚାଳନା : ଗଜା ପୂର୍ବରୁ ଘାସ ବମନ ନିମନ୍ତେ ଧାନ ବୁଣିବାର ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ ମିଲିଗ୍ରାମ ପ୍ରିଲିଲକ୍ଲୋର ୩୦.୭ % ଇସି କିମ୍ବା ୨୫୦ ମିଲିଗ୍ରାମ ଅକ୍ଟିଫ୍ଲୁରୋଫେନ୍ ୨୩.୫ % ଇସି କିମ୍ବା ୪୫୦ ମିଲିଗ୍ରାମ ଅକ୍ଟାଡିଆରଜିଲ ୬% ଇସି କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଗଜା ପୂର୍ବରୁ ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ ଧାନ ବୁଣିବାର ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୨୦ ମି.ଲି. ବିସ୍ଫାଘାତକ ସୋଡିୟମ ୧୦% ଏସ.ସି., ବୁଣିବାର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ରୁଆ ଧାନ : ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି : ୭ ରୁ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିକୁ ଦୁଇଥର କାଦୁଅ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜମିକୁ ସମତଳ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ ଥର କାଦୁଅ ସମୟରେ ସବୁଜ ସାର ରୂପେ ଆଗରୁ ଧଳିଆ ବୁଣିଥିଲେ ସେହି ଗଛକୁ ତାହାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଅନ୍ତିମ କାଦୁଅ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଜମିରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଶଙ୍ଖା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ତଳିଘରା ପରିଚାଳନା: ଧାନ ତଳିଘରାରେ ନଳୀ ପୋକ, କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ, ବଙ୍ଗୀ ପୋକ, ପତ୍ର ମୋଡ଼ା ପୋକ ଏବଂ ଚେର ଗଣି ସ୍ୱତ୍ର କୃମି ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ରୁଆ ପରଠାରୁ ୩ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୦ ଡେସିମିଲି ତଳିଘରା ରେ ରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟର ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲୋରାକ୍ସିନିଲପ୍ରୋଲ୍ ୦.୪% ଜି @ ୪୦୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା କାର୍ବାମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪% ଜି.ଆର୍ @ ୮୦୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ ୦.୩୫% ଜି.ଆର୍ @ ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
କପା	ଚାରା ଅବସ୍ଥା	- ଜମିରୁ ବଳକା ବର୍ଷାପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । - ଶୋଷକ ପୋକ (ଉକୁଣିଆ ପୋକ, ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ ଏବଂ ଧଳାମାଛି) ର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦-୮୦୦ ମି.ଲି. ନିମ୍ବ ଡେଲ + ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସର୍ପ/ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଉଡରକୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ) ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । - ଶୋଷକ ପୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ବମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ଲେଗାଏଁ ହଲଦିଆ ଅଠା ବୋଳା କାର୍ଡ (Yellow sticky traps) ଲଗାନ୍ତୁ । ଘାସ ପରିଚାଳନା : ଗଜା ପୂର୍ବରୁ ଘାସ ବମନ ନିମନ୍ତେ ବୁଣିବାର ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପିଛା ଏକ ଲିଟର ପେଣ୍ଟିମିଥାଲିନ୍ ୩୦% ଇସି କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ମାଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବତର ଥିବା ସମୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ହରଡ଼	ଚାରା ଅବସ୍ଥା	- ଜମିରୁ ବଳକା ବର୍ଷାପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । - ଫସଲରେ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବେ କ୍ଷେତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ । ଜଉପୋକ (ଆଫିଡ୍) ଏବଂ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଭଳି ଶୋଷକ ପୋକଙ୍କ ବାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (୧୫୦୦ ppm) ଲିଟର ପ୍ରତି ୩ ମି.ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଘାସ ପରିଚାଳନା : ଏକର ପ୍ରତି ୩୦୦ ମି.ଲି. ଇମାଜେଥାପିର୍ ୧୦% ଏସ୍.ଏଲ୍ (Imazethapyr 10% SL) କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବିହନ ବୁଣିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ମକା	ଚାରା ଅବସ୍ଥା	- ଜମିରୁ ବଳକା ବର୍ଷାପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ନାଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । - ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କ୍ଷେତ୍ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । - ଶୋଷକ ପୋକ (ଜଉପୋକ ଏବଂ ଉକୁଣିଆ ପୋକ) ଓ ଫଲ୍ ଆର୍ମିଘାର୍ମ ର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (୧୫୦୦ ppm) ଲିଟର ପ୍ରତି ୫ ମି.ଲି. ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଘାସ ପରିଚାଳନା : ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ନିର୍ମଳ ଥିବା ସମୟରେ ବିହନ ବୁଣିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୧୫ ମି.ଲି. ଟେମ୍ବୋଟ୍ରିଓନ୍ ୩୪.୪% ଏସ୍.ସି (Tembotrione 34.4% SC) କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି		
ଲଙ୍କା	ଚାରା /ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥା	୩୦ ରୁ ୪୫ ଦିନର ଚାରା ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କରନ୍ତୁ । - ପ୍ରତିରୋପଣ କରି ସାରିଥିଲେ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପୁନଃ ନୂଆ ଚାରା



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



		କୁ ପ୍ରତି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ । ■ ଉକୁଣିଆ ପୋକ: ବର୍ତ୍ତମାନ ର ତାପମାତ୍ରା ଉକୁଣିଆ ପୋକ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ପ୍ରତିରୋପଣ ର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ଚାରିପଟେ ମକା ଲଗାନ୍ତୁ । ଏକର ପିଛା ୧୨ ରୁ ୧୫ ଟି ନୀଳ ଅଠାଳିଆ କାଟ ଲଗାନ୍ତୁ ।
କଦଳୀ	ଅଙ୍ଗୀୟା/ଫଳ ଅବସ୍ଥା	■ ସମ୍ପ୍ରତି ପାଗରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ କଦଳୀ ଗଛରେ ସିଗାଟୋକା ପତ୍ର ଦାଗ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ସିଗାଟୋକା ରୋଗ ହାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଏବଂ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପତ୍ର କୁ ଅଲଗା କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ । କଦଳୀ ବାଡ଼ି ରେ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବ । ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାର୍ବେନ୍‌ଡିମ୍ ଓ ମାଙ୍କୋଜେବ ର ମିଶ୍ରିତ ଫିଫିନାଶକ କୁ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ଅଥବା ପ୍ରୋପିକୋନାୟୋଲ ୨୫% ଇସି ୧ ମିଲିଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିତା ୦.୫ ମିଲି ଆଡ଼ଭୁଭାକ୍ସି ମିଶ୍ରଣ କରି ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ମାଛ ଚାଷ		■ ନୂଆଁ ଯାଆଁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ଏବଂ ଶିକାରୀ ମାଛକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହାର କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶିକାରୀ ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଏକର ପାଇଁ ୧ ହଜାର କିଲୋଗ୍ରାମ ସଜ ମହୁଲ ପିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା କ୍ଲିଂ ପାଉଡର ସହିତ ୩୦ କି.ଗ୍ରା ଯୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସବୁ ମାଛ ମରିଯାଆନ୍ତି ।
ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ		
ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି		ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର, ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଭଲ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଥିବା ଗୃହାଳରେ ରଖନ୍ତୁ । ଖୁରା ରୋଗ (FMD), ସାହଣ (HS) ଏବଂ ବଜବଜିଆ (BQ) ବିରୋଧରେ ନିୟମିତ ଟିକାକରଣ କରାନ୍ତୁ ।
ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଟା		ମେଣ୍ଟା ଓ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପାଣି ଜମିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କୁକୁଡ଼ା		କୁକୁଡ଼ା ଘରକୁ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ । ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଭିଜା ଲିଟରକୁ ଦୂରରୁ ବଦଳାନ୍ତୁ । ପରିଷ୍କାର ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣି ପାତ୍ର (ଡ୍ରେକର) ଓ ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ର (ଫିଡର)କୁ ନିୟମିତ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

ନୋଡାଲ ଅଫିସର

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା

ବି.ବ୍ର:- ଭାନୀୟା ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ “ମଉସମ”, ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ସୂଚନା ପାଇଁ “ମେଘଦୂତ” ଓ ବିକ୍ରି ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ “ବାମିନୀ” ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । କୃଷିରେ ଅଧିକତର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ **ଓୟୁଏଟି କଲିଙ୍ଗ** ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ବିହନ, ଚାରା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଟିସୁ କଲର ଚାରା, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ , ଅଲୁକିକା ଯାଆଁ/ ବର୍ଷକାୟା ଯାଆଁ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ, ପଶୁ ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜି , ଜୀବାଣୁ ସାର , ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ , ଜିଆ ଓ ଜିଆଖଟ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି) । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ର ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଓ କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ସୂଚନା ଏବେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମେଘଦୂତ ଆପ ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ।
(Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)