



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



ପତ୍ର ସଂ-୧୪/୨୦୨୬ ସପ୍ତାହ-୦୭ ମଙ୍ଗଳବାର, ତାରିଖ-୧୭.୦୭.୨୦୨୬

ଭବାନୀପାଟଣା କୃଷିପାଣିପାଗ କ୍ଷେତ୍ର ଯୁନିଟ୍ ରେ ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା :

ସର୍ବମୋଟ ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ (୦୧-୦୧-୨୦୨୬ ଠାରୁ)	୦୦/୦୦
ସାପ୍ତାହିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ(ମିମି) / ବର୍ଷା ଦିନ	୦୦/୦୦
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ($^{\circ}\text{C}$)	୩୧.୮
ସାପ୍ତାହିକ ହାରାହାରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ($^{\circ}\text{C}$)	୧୩.୭

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ :

ଜିଲ୍ଲା	ତାରିଖ	ବର୍ଷାର ପରିମାଣ (ମି.ମି.)	ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ($^{\circ}\text{ସେ.}$)	ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ($^{\circ}\text{ସେ.}$)	ଆକାଶରେ ମେଘର ପରିମାଣ (ଅକଟା)	ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଅଦ୍ରବ୍ୟତା (%)	ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଅଦ୍ରବ୍ୟତା (%)	ପବନର ବେଗ (କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା)	ପବନର ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)
କଳାହାଣ୍ଡି	୧୮-୦୭-୨୦୨୬	୦	୩୨	୧୪	୧	୫୯	୧୨	୪	୧୪୯
	୧୯-୦୭-୨୦୨୬	୦	୩୩	୧୪	୧	୫୧	୧୧	୪	୧୪୯
	୨୦-୦୭-୨୦୨୬	୦	୩୪	୧୫	୩	୪୨	୧୨	୪	୧୪୩
	୨୧-୦୭-୨୦୨୬	୦	୩୪	୧୬	୨	୩୫	୧୧	୪	୧୪୯
	୨୨-୦୭-୨୦୨୬	୦	୩୫	୧୬	୨	୩୨	୧୧	୫	୧୫୭

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍.#୦୬୭୪ - ୨୫୯୬୧୧୭

ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପାଣିପାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତସାର/ସତର୍କ ସୂଚନା

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଉପରୋକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ପବନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୦୪ ରୁ ୦୫ କି.ମି. ବେଗରେ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଦିନର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ହାରାହାରି ୩୨ ରୁ ୩୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୪ ରୁ ୧୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେ. ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୨ ରୁ ୫୫ % ଓ ୧୧ ରୁ ୧୨ % ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ଟେଡାବନୀ : ନାହିଁ (ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮.୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ) ।

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପରାମର୍ଶ

ସାଧାରଣ ପରାମର୍ଶ

- ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜମିରେ ମାଟିର ବତର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଫସଲ ଯଥା ମୃଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ, ବୁଟ, ମଟର, ମକା ଇତ୍ୟାଦିରେ ପାଣିର ଅଭାବକୁ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମତେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।
- ଜମିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଫସଲ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଘାସ ବାଉର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କୋଡା ଖୋସା କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଫସଲରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ର ଉପସ୍ଥିତି କୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
- ଉତ୍ପାଦନ ର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଜୈବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏଜେଣ୍ଟ, ଜୈବିକ ଜୀବନାଶକ, ଫେରୋମୋନ/ଆଲୋକ ଗ୍ରାହ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରି ସମନ୍ୱିତ ପୋକ ପରିଚାଳନା (IPM) ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
- ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯଥା ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଫାଟୁଆ, ସାହାଣ, ବଜବଜିଆ, ଛେଳି ମଡ଼କ ଓ ଛେଳି ବସନ୍ତ ଆଦି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଟୀକାକରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଗୃହ ପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା	ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଫଳଧାରଣ କିମ୍ବା ଛୁଇଁ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳାଭାବ ପ୍ରଭାବରେ ଅମଳ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ
ଫସଲ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ	
ଫସଲ (ଅବସ୍ଥା)	ପରାମର୍ଶ
କ୍ଷେତ୍ର ଫସଲ	
ଡାକୁଆ ଧାନ (ପିଲ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା)	ଖାଦୁସାର ପରିଚାଳନା: ଛଟା ବୁଣା ଧାନରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ସାର ହିସାବରେ ଏକର ପିଛା ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ସାରକୁ ବୁଣିବାର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ରୁଆ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଇବାର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ସାରକୁ



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



	ପ୍ରଥମ କିଛି ସାର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ■ ଘାସ ପରିଚାଳନା: ଗଜା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଘାସମରା ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ ଏକର ପିଛା ରୋଇବାର ୮ ରୁ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ପାଇରାଜୋସଲଫ୍ୟୁରାନ ଲଥାଇଲ ୧୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି କିମ୍ବା ରୋଇବାର ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୧୨୦ ମିଲିଗ୍ରାମ ବିଶପାଇରିବେକ ସୋଡ଼ିୟମ ୧୦% ଏସ.ସି କିମ୍ବା ବୁଣିବା କିମ୍ବା ରୁଆ ର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୩୦୦ ମିଲି ଫେନୋକ୍ସାପ୍ରୋପ ପି ଲଥାଇଲ ୯% ଇସି କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ■ ରୋଗ ଓ ପୋକ ପରିଚାଳନା: ■ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଓ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକ: କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ଓ ପତ୍ରମୋଡ଼ା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଏକର ପିଛା ୫ ମିଲିଗ୍ରାମ ଲିଓର ବିଶିଷ୍ଟ ୩ ଟି ଫେରୋମୋନ ଗ୍ରାପ ଲଗାନ୍ତୁ । ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯନ୍ତା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ହେଉଥିବ ତେବେ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୪ ମିଲିଗ୍ରାମ ଆକାଡ଼ିରକଟିନ୍ ୦.୧୫% ନିମ୍ବ ଜାତୀୟ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଦାନାଦାର ଔଷଧ ଭାବରେ ଏକର ପିଛା ୧୦ କି.ଗ୍ରା. କାର୍ଟାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ ୪ଜି କୁ ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନଚେତ ଏକର ପିଛା ୬୦ ମିଲି କ୍ଲୋରାନ୍ଥ୍ରାମିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୧୮.୫% ଏସ.ସି କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ■ ମହିଷା ରୋଗ: ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ପ୍ରତି ଡ୍ରମ୍ ପିଛା (୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ) ୬ ଗ୍ରାମ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% ଓ ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋକ୍ସିସ୍ଟେବିନ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି ର ମିଶ୍ରିତ ଫର୍ମିନାଶନ କିମ୍ବା ୨୫ ମିଲିଗ୍ରାମ ଆଇସୋପ୍ରୋଥ୍ରେଲେନ ୪୦% ଇ.ସି କିମ୍ବା ୨୫ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେନଡାଜିମ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲୁ.ପି କିମ୍ବା ୧୫ ମିଲି ହେକ୍ସାକୋନାୟୋଲ୍ ୫% ଇସି କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ମୁଗ ଓ ବିରି (ଫୁଲ ରୁ ଛୁଇଁ ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥା)	ଜଳସେଚନ: ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଗ ଓ ବିରିରେ ଫୁଲ ରୁ ଛୁଇଁ ଧରିବା ସମୟ । ତେଣୁ ମୁଗ ଓ ବିରି ଫସଲରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହା ସଙ୍କଟଜନକ ସମୟ । ଏହି ସମୟରେ ଜମିରେ ଜଳର ଅଭାବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ । ■ ସାହେବୀ ରୋଗ : ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗରେ ଶୋଷକ ପୋକ ଯଥା ଧଳା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ସାହେବୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ । । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୮ ଟି ଅଠା ଲାଗିଥିବା ହଳଦିଆ ଜନ୍ତା (Yellow Sticky Trap) ଲଗାନ୍ତୁ। ସଂକ୍ରମିତ ଗଛକୁ ଅପାଡି ଦୂରରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ୫ ମି.ଲି ନିମ୍ବ ତେଲ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ ଆକାଡ଼ିରାକ୍ଟିନ୍ ୦.୦୩% (୩୦୦ ପିପିଏମ୍) କୁ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଡ୍ରମ୍ ପିଛା (୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ) ୪ ମିଲିଗ୍ରାମ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ.ଏଲ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ଥାଇମିଥୋକ୍ସିମାମ୍-୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି କିମ୍ବା ୩୫ ମିଲିଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫୋସ୍ ୨୦% ଇ.ସି କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଚଣା/ବୁଟ (ଛୁଇଁ ବାହାରିବା ରୁ ପାକଳ ଅବସ୍ଥା)	■ ଛୁଇଁ ବିକ୍ଷା ପୋକ: ପୋକ ସଂଖ୍ୟା କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ହେଲି ଲିଅର୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା (ଫେରୋମୋନ ଗ୍ରାପ) ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଲିଅର୍ କୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ■ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗୋଟି ପୋକ: ପୋକ ସଂଖ୍ୟା କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ସ୍ନୋଡୋ ଲିଅର୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା (ଫେରୋମୋନ ଗ୍ରାପ) ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଲିଅର୍ କୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ସୋରିଷ (ଛୁଇଁ ବାହାରିବା ରୁ ପାକଳ ଅବସ୍ଥା)	■ ପତ୍ର ଛନ୍ଦା ଓ ଠିକିରି ପିଠିଆ ପ୍ରଜାପତି ପୋକ: ଫସଲର ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପତ୍ର ଛନ୍ଦା ଓ ଠିକିରି ପିଠିଆ ପ୍ରଜାପତି ପୋକ ଦେଖା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ରୁ ୯୦ ଗ୍ରାମ ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ବେନଜୋଏଟ୍ ୫% ଏସ.ଜି କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଡିନାବାଦାନ (ଫୁଲ ରୁ ପାକଳ ଅବସ୍ଥା)	■ ଜଳସେଚନ: ଫୁଲ ଧରିବା ଓ ଫଳ ହେବା ଅବସ୍ଥା ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସଙ୍କଟଜନକ ସମୟ । ଏହି ସମୟରେ ଫସଲରେ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ■ ରୋଗ ଓ ପୋକ ପରିଚାଳନା: ■ ଧଳାମାଛି/ ଜଉ/ ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ/ ଉକୁଣିଆ ପୋକ: ଶୋଷକ କୀଟ ସମୂହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ଅଠା ଲାଗିଥିବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଯନ୍ତା ବା କାର୍ଡ ଏବଂ ଉକୁଣିଆ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ଅଠା ଲାଗିଥିବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଯନ୍ତା ବା କାର୍ଡ କୁ କୁ ଜମିରେ ଫସଲର ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ । ରାସାୟନିକ ଉପାୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧ ଗ୍ରା. ଥିଫେଥୋକ୍ସିମାମ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜି କିମ୍ବା ୧.୫ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ.ଏଲ. କୁ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ■ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗୋଟି ପୋକ: ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୮ ଟି ସ୍ନୋଡୋ ଲିଓର ଲାଗିଥିବା ଫେରୋମୋନ ଗ୍ରାପ୍ ବା ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଜନ୍ତା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ଲିଓର କୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



	ଟୀକା: ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଟୀକା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଲେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୪୦୦ଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋଥାଲୋନିଲ ୭୫% ଡବ୍ଲୁପି କିମ୍ବା ୩୦୦ ମି.ଲି ହେକ୍ଟୋକୋନାଜଲ ୫% ଇସି କିମ୍ବା ୬୦୦ ଗ୍ରାମ ମାଙ୍କୋଜେବ ୭୫% ଡବ୍ଲୁପି ଆଦି ଫିଙ୍ଗିନାଶକ କୁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ
ଭଦ୍ୟାନ କୃଷି	
ଲଙ୍କା (ଫୁଲ ରୁ ଫଳ ଅବସ୍ଥା)	ରୋଗ ଓ ପୋକ ପରିଚାଳନା: ଫଳସଜା ଓ ଅଗମରା ରୋଗ: ଲଙ୍କା ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଏହିପାଖରେ ଫଳସଜା ଓ ଅଗମରା ରୋଗ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତିଷେଧକ ରୂପେ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨ ମିଲି କିଟାଜିନ୍ ୪୮% ଇସି କିମ୍ବା ୧ ମିଲି ଆୟୋକ୍ସିଷ୍ଟେବିନ୍ ଓ ଟେବୁକୋନାୟୋଲ୍ ୧୮.୩% ଏସ.ସି ର ମିଳିତ ଫିଙ୍ଗିନାଶକ କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଫିଙ୍ଗିନାଶକ କୁ ଥରେ ଫୁଲ ଆସିବା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏବଂ ଥରେ ଫଳ ଧରିବା ସମୟରେ ସ୍ତେଷ କରନ୍ତୁ ।
ପିଆଜ (ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା)	ଜଳ ପରିଚାଳନା: ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା: ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ପିଆଜ ୭-୮ ସପ୍ତାହର ହୋଇଗଲେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏକରକୁ ୨୩ କି.ଗ୍ରା ଯୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ । ବାଦାମୀ ବ୍ଲେର୍ (ପରପଲ ବ୍ଲେର୍) : ଏହି ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଡାଇଫେନୋକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫% ଇ.ସି କିମ୍ବା ଟେବୁକୋନାଜୋଲ୍ ୨୫.୯% ଇ.ସି କିମ୍ବା କିଟାଜିନ୍ ୪୮% ଇ.ସି କୁ ୧ ମିଲିଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପିଆଜ ଗଛର ପତ୍ର ଅଧିକ ଟିକଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଔଷଧ ସହିତ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୫ ରୁ ୧ ମିଲିଗ୍ରାମ ଷ୍ଟିକର୍ କିମ୍ବା ସ୍ତେଡର୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ବାଇଗଣ (ଅଙ୍ଗୀୟ ରୁ ଫଳ ଅବସ୍ଥା)	ଧଳା ମାଛି: ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକର ପ୍ରତି ୮-୧୦ ଟି ଅଠା ଲାଗିଥିବା ହଳଦିଆ ଯନ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ୩୦ ମି.ଲି ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (ଆୟାଡିରାକଟିନ୍ ୧୫୦୦ ପିପିଏମ୍) କୁ ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।
ଆମ୍ବ (ଫୁଲ ଅବସ୍ଥା)	ରୋଗ ଓ ପୋକ ପରିଚାଳନା: - ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ପୋକ: ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଏହି ପୋକ ଦୃତ ଗତିରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆୟାଡିରାକଟିନ୍ ୦.୦୩% (୩୦୦ ପିପିଏମ୍) କୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମିଲିଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପେନ୍ଥା ପିଛା ୪ ରୁ ଅଧିକ ଡାହାଣୀ ପୋକ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଡ୍ରମ୍ ପିଛା (୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ) ୪ ମିଲିଗ୍ରାମ ଜମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ.ଏଲ କିମ୍ବା ୩ ଗ୍ରାମ ଆୟାମିଥୋକ୍ସିଯାମ୍-୨୫% ଡବ୍ଲୁଜି କିମ୍ବା ୧୦ ମିଲି ଡାଇମିଥୋଏଟ୍ ୩୦% ଇସି କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । - ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ: ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ପାଉଁଶିଆ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମିଲିଗ୍ରାମ ହେକ୍ଟୋକୋନାୟୋଲ ୫% ଇସି ଏବଂ ୦.୫ ମିଲି ଷ୍ଟିକର୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଗୁହ ପାଳିତ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ	
ଗାଈ ଓ ମଇଁଷି	ଦିନରେ ମଧ୍ୟମ ତାପମାତ୍ରା ଓ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଗାଈମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସନଳୀ ରୋଗ ଓ ମାଷ୍ଟାଇଟିସ୍ ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେଣୁ ରାତିରେ ଗୁହାଳ ଭିତରକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନର ପ୍ରବେଶ କୁ ରୋକିବା ଓ ଗୁହାଳକୁ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ।
ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଡା	ଦିନ ଓ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଲେ ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଡା ମାନେ ନିମୋନିଆ ଓ ଡାଏରିଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ରାତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରୟ ଓ ନିୟମିତ ଟିକାକରଣ ସହ କୃମିନାଶକ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କୁକୁଡ଼ା	ଥଣ୍ଡା ରାତି ଓ ମଧ୍ୟମ ଆର୍ଦ୍ରତାରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର CRD ଭଳି ଶ୍ୱାସନଳୀ ରୋଗ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଥିବା ଘରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ନ ଲାଗିବା ପରି ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହ ଓ ଲିଟର ଯଥା ଚରଣାରେ ବିଚାଯାଇଥିବା ଚଷ୍ମୁକୁ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ।

ନୋଡାଲ ଅଫିସର

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା , ଭବାନୀପାଟଣା

ବି.ଦ୍ର:- ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ “ମଉସମ”, ପାଣିପାଗ ଭିତିକ କୃଷି ସୂଚନା ପାଇଁ “ମେଘସୂଚ” ଓ ବିଜୁଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ “ବାନିନୀ” ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।



ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମୌସମ ସେବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରସାରଣ କେନ୍ଦ୍ର , ଭବାନୀପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି
(ପଶୁମ-ପାହାଡ଼ିଆ କୃଷି ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳ)



କୃଷିରେ ଅଧିକତର ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ଓୟୁଏଟି କଳିଙ୍ଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ବିହନ, ଚାରା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଚିପ୍ସ କଲ୍ଚର ଚାରା, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ , ଅଳ୍ପବିକା ଯାଆଁଳ/ ବର୍ଷକୀୟା ଯାଆଁଳ, କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ, ପଶୁ ପ୍ରଜାତି, ଛତୁ ଓ ମଞ୍ଜି , ଜୀବାଣୁ ସାର , ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ , ଜିଆ ଓ ଜିଆଖଟ ଏବଂ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି).

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ର ପାଣିପାଗ ଆକଳନ ଓ କୃଷିପାଣିପାଗ ଜନିତ ସୂଚନା ଏବେ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମେଗହଦୂତ ଆପ ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଆପ ତାହାହାତ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।
(Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot>), (iOS: <https://apps.apple.com/in/app/meghdoot/id1474048155>)