



DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION
ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ
ODISHA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY
Bhubaneswar, Pin - 751003
 Phone: 0674-2397362 (O), 9437130933 (M)
 E-mail: dee@ouat.ac.in

ଧାନରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ/ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚିହ୍ନଟ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଓ ପରିଚାଳନା

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଓ ଆଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଫସଲରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବା ଚକଡ଼ା ଏବଂ ଧଳା ପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।


ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ:

ତାପମାତ୍ରା (ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍)	ଆପେକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା	ପବନର ବେଗ (କିମି/ ଘଣ୍ଟା)	ବର୍ଷା (ମି.ମି./ ସପ୍ତାହ)	ଅନୁକୂଳ ପାଣିପାଗ
>୩୦	>୭୦	୫ ରୁ ଅଧିକ	୦-୩୦	ବର୍ଷା ପରେ ଖରା ଓ ଆର୍ଦ୍ର ବାତାବରଣ, ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨୧-୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ଏହି ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୋକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଫସଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ।

ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଲକ୍ଷଣ:

ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକ/ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଏକ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ମାଛି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାନ୍ତି । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଗଛର ମୂଳରେ ଓ ଜଳସ୍ତର ର ଠିକ ଉପରି ଭାଗରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ହଲଚଲ କରିଲେ ମାଛି ଭଳି ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି । ଏହି କୀଟ ସହିତ ଧଳାପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ମଧ୍ୟ ମିଶିକରି ଲାଗିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଧାନ ଫସଲର ଫୁଲ ଉଡେଇବା ଓ କେଣ୍ଡା ବାହାରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଗି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ।

- ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ତଳ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ଫିକା ବା ଇଷତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଏ ।
- ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭରେ କ୍ଷେତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ ଓ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଧିକ ହେଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶୁଖିଯାଇ ପୋଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଛିତିକୁ 'ହପର୍ ବର୍ନ' କୁହାଯାଏ ।
- ଏହି ଶୋଷକ ପୋକର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଅପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ଗଛ ମୂଳ ସଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ।
- ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ମଧୁ ଶିଶିର, ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ବ୍ୟାଘାତ କରିଥାଏ ।



ଧାନରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ/ ଚକଡ଼ା ପୋକର ପରିଚାଳନା:

- ନିୟମିତ ଭାବରେ ଫସଲ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଧାନ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆଡେଇକରି ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ଓ ଧଳା ପିଠିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ଅବସ୍ଥିତି କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ।
- ପୋକ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନସାରଜନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ପୋଟାଶ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଳ ସେଚନ ଓ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ଥିଲେ କ୍ଷେତରେ ଠିଆ ପାଣି ନରଖି ଜମିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଶୁଖିଲା ଓ ଓଦା ରଖନ୍ତୁ ।



ଧୂରିଆ ପକାନ୍ତ ନାହିଁ



ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ

- ନିୟମିତ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଫୁଟ ଛାତି ପୂର୍ବ-ପଶ୍ଚିମ କରି କ୍ଷେତରେ ପାହି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଢ଼ିଥିବା ଧାନକୁ ବୁଦ୍ଧ ପଟକୁ ଆଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଗଛର ମୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ହେବ ।
- ଏହି ସମୟରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରାଇରିଅଣ୍ଡ କୀଟନାଶକ କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଲରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ଷେପକ ଭାବେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମିଲି ନିମ୍ଫ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ (୧୫୦୦ ପିପିଏମ୍ ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍) କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ବୁଦାପ୍ରତି ପୋକ ସଂଖ୍ୟା ୨ - ୫ ଥିଲେ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ଗ୍ରାମ୍ ଡାଇନୋଟେପ୍ଟୋରାନ୍ ବା କ୍ଲୋଥ୍ରାଆନିଡିନ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବୁଦା ପ୍ରତି ୫ ରୁ ୧୦ ଟି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ, ୨୦ ଗ୍ରାମ୍ କ୍ଲୋନିକାମିଡ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି ବା ୧୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍ ୫୦% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି. ବା ୯୫ ମିଲି ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୁମେଡୋପାଇରିମ୍ ୧୦% ଏସ୍.ସି ବା ଏକର ପ୍ରତି ୧୩୫ ଗ୍ରାମ୍ ଡାଇନୋଟେପ୍ଟୋରାନ୍ ୧୫% + ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍ ୪୫% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ବି.ବ୍ର. ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧ କୃଷି ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ୧୫୫୩୩୩୩ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।



କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାରଣ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା

